

Kärlanestesi

Boken

Innehållsförteckning

1	Introduktion	3
1.1	Syfte	3
1.2	Medförfattare	3
2	Allmänt	4
2.1	Välkommen till kärlsektionen!.....	4
3	Allmänna rutiner & riktlinjer	5
3.1	Rekommendationer för anestesiform vid olika ingrepp.....	5
3.2	Preoperativ utredning vid kärllkirugi.....	6
3.2.1	Riskbedömning.....	6
3.2.2	Utredning inför kärllkirugi (sammanfattning/lathund):.....	6
3.3	Dexmedetomidin för sedering vid kärllkirurgiska ingrepp.....	7
3.4	Spinaldrän och spinal ischemi.....	8
3.5	Post op checklista för kärllkirugi.....	11
4	Aortakirurgi.....	12
4.1	Anestesi vid öppen operation av bukaortaaneurysm (BAA) - elektiv / akut	12
4.2	Anestesi vid elektiv EVAR på hybridsalen.....	15
4.3	Anestesi vid komplicerad endovaskulär aortakirurgi.....	17
5	Carotiskirurgi	20
5.1	TEA Carotis i LA+sedering.....	20
6	Referenser	24
7	Index.....	25

1 Introduktion

1.1 Syfte

K-boken syftar till att överskådligt och lättillgängligt samla riktlinjer och övrig information inom kärlanestesi på ett och samma ställe. Kontinuerligt tillfogas (och avlägsnas) ytterligare dokument varefter de tillkommer och/eller revideras och/eller blir inaktuella.

Det övergripande målet är att informationen ska vara överskådlig och praktiskt användbar. Läsaren förväntas ha mer än god grundkunskap och dessa riktlinjer skall ses som just riktlinjer och stöd i den kliniska vardagen till en redan erfaren kliniker.

Således, i den mån du som specialistkompetent anestesilog gör en annan bedömning inför en specifik patient, så är det din skyldighet att frångå riktlinjerna i denna bok. I den mån du som icke-specialistkompetent gör en annan bedömning än vad som står häri, så diskutera det med din specialistkollega så blir ni säkert överens och den icke-riktlinje-kompatibla patienten får som avsett den bästa av vård!

Vidare är all text inte nödvändigtvis godkänd hos kundkliniker och andra samverkande aktörer. Detta för att innehållet är främst av anesthesiologisk karaktär och inte i detalj berör andras ansvarsområden. Icke desto mindre är innehållet synkroniserat i allt väsentligt med övriga klinikers riktlinjer.

Och framför allt: feedback välkomnas och kan ses som obligatoriskt. Maila k-boken@anopiva.se och snabb respons utlovas!

Happy K-ing! / Henrik Jörnvall, Halla Halldórsdóttir, Johan Nordström

1.2 Medförfattare

Halla Halldórsdóttir, halla.halldorsdottir@sll.se

Henrik Jörnvall, henrik@jornvall.se

Johan Nordström, johan.l.nordstrom@sll.se

2 Allmänt

2.1 Välkommen till kärlsektionen!

Hej!

Välkommen till K! Detta dokument presenterar snabbt sektionen och får dig att komma igång inom sektionen. Vi går igenom dokumentet tillsammans och börjar pricka av i checklistan till höger som kommer följa dig genom hela placeringen.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du tar ansvar för din egen utbildning och aktivt ser till att du blir exponerad för allt inom sektionen och initierar sit-ins.

Att du själv förkovrar dig i relevant litteratur och referenser. Fråga vilka!

Att du ger oss feedback om hur vi kan bli bättre och/eller göra din placering mer givande.

Att du sparar detta papper samt använder din loggbok; det ligger till grund för ditt avslutningssamtal och intyg från placeringen.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Att vi alltid finns till hands och att vi gör vårt yttersta för att planera dina dagar till meningsfullhet och variation.

Att vi hela tiden ger dig feedback; både sånt som är bra och sånt som kan utvecklas.

Att du får välja/tilldelas två faddrar (en ST-kollega (i början av din placering) och en specialist) som du har förtroende för.

Att vi kommer kräva att du uppfyller punkterna under "Vad förväntar vi oss av dig?".

Kul och välkommen!

ST/UL-läkarens namn:

Placeringstid:

Dagens datum:

Genomgång med:

Handledare:

Anestesierfarenhet:

Checklista:

- Introduktionsdokument (detta+K-boken)
- Presentation av fasta medarbetare
- Rundvandring (hybr)
- PM/rutiner/referenser
- Funktionssökare/telefoner (inkl kundkliniker)
- Mottagningsarbetet, std-operationer
- Egna önskemål och förväntningar
- Flitlista
- Finns möjlighet/önskemål om ST-projekt?
- "Miniprojekt"
- Sit-in vid halva placeringstiden
- Halvtidssamtal och avstämning
- Sit-in vid slutet av placeringen
- Avslutningssamtal och intyg

3 Allmänna rutiner & riktlinjer

3.1 Rekommendationer för anestesiform vid olika ingrepp

Nedan följer rekommendationer och/eller vanligen använda anestestekniker för olika typ-
ingrepp. **Generellt påminns om att preanestesibedömning framför allt syftar till att ta en ordentlig anamnes, eventuellt komplettera den preoperativa utredningen, samt grovt planera anestesi i samförstånd och i samråd med patient och operatör.** Således bör man vara tämligen restriktiv med att kommentera själva utförandet och detaljerna vid kommande anestesi – detta är upp till ansvarig anesthesiolog att besluta, och i preanestesibedömningen angivna råd (till exempel "glidescope på sal", eller dess motsats "glidescope bedöms ej nödvändigt") kan vara svåra att reversera/ompröva. Bättre är att objektivt redogöra för fynd och allmänna bedömningar (tex "möjligen svår luftväg") och lämna genomförandet till ansvarig anesthesiolog. Motsvarande gäller vid övergripande val av anestesimetod och postoperativ smärtlindring; många ingrepp är av naturen dynamiska och "work in progress", och patienten kan tex informeras om trolig ryggbedövning, men exakt typ i anteckningen bestämmas till "SPA/EDA i samråd med operatör beroende på omfattning av kirurgi". Ofta finns en anteckning från remissbedömning, behandlingskonferens, inskrivning eller operationskonferens, vilken kan ge vägledning till lämplig anestesimetod. Icke-specialist bör ha låg tröskel för diskussion med specialist och vid framför allt akuta ingrepp är det svårt att ge generella riktlinjer och råd.

Laparotomier (tex öppen operation av bukaortaaneurysm – BAA)

GA + artärkat + EDA. CVK pga frekvent behov av vasopressor och/eller postoperativ nutrition/farmakologi. Se separata riktlinjer (tex TEE vid öppen aortakirurgi).

Perifer öppen kärlkirurgi (tex olika typer av femoral bypass) samt TEA ljumske

Erfarenhetsmässigt kan SPA med normobar bupivacain i många (de flesta?) fall vara helt adekvat under själva operationen, men SPEDA eller EDA ofta optimalt pga även god postoperativ analgesi (detta ffa distala och/eller vid kritisk ischemi). För TEA dock oftast enkom SPA pga förutsägbar (relativt kort) operationstid och inget postoperativt behov. Låg tröskel för artärkateter. Peroperativt administrerad heparin måste beaktas vid EDA-dragning på postop enligt riktlinjer SFAI.

Perkutana ingrepp (EVAR, FEVAR, GrEVAR, PTA, embolisering)

Allt från LA, via SPA/EDA till GA är möjligt; vid EVAR är LA/sedering (gärna dexmedetomidin) rutin. Beakta att de sjukare patienterna lämpligen görs vaket (i LA/SPA/EDA), men att de å andra sidan oftast har svårt med compliance (och ingreppet kan vara långt och tarva många apné-perioder för bildserier). Observera vid vaken patient att operationsmetoden ofta kräver lång tid i rygggläge; så även fortsatt 6 timmar postoperativt. Vid FEVAR och GrEVAR är GA rutin pga generellt lång operationstid samt många apné-perioder. Då även ofta CVK och vid GrEVAR möjligen spinaldrän. Samråd/diskussion med operatör på tidigt stadium och peroperativt är essentiellt. Obligat artärkateter av många skäl: patientklientel, förestående operation, operationstid, samt önskad blodtryckskontroll. PTA: perkutan transluminal angioplastik; EVAR: endovascular aortic repair; FEVAR: Fenestrerad EVAR; GrEVAR: Grenad EVAR.

Endovenektomier (inklusive posttrombotiskt syndrom)

Hybridgrepp på oftast yngre patienter. Kombinerad öppen venkirurgi i ljumsknivå samt venstentning (dvs venös motsvarighet till artäriella PTA + TEA-ljumske). Lång operationstid

och smärtsam venstentning gör att generell anestesi är idealiskt, möjligen med tillägg morfinspinal. Ej EDA då högdos heparin/fragmin påbörjas direkt postoperativt och ska fortgå en månad.

Venstentning (enbart) av bäckenkärl

Vid posttrombotiskt syndrom ibland enkom venstentning (alltså ej endovenektomi). Oftast intubationsnarkos då kärlaccess från v.jug.int.dx.

AV-fistel / PD-kateter

Patienterna är ofta multisjuka och per definition med svår njursvikt. Planera gärna dialys dagen före operationsdagen för bra elektrolytkontroll utan perioperativa vätskeskiften. För AV-fistel är förstahandsvalet plexusblockad med tillägg LA/sedering; annars GA med lämpligen LMA. PD-kateter oftast lämpligen GA då adekvat smärtlindring kan vara svårt med LA. Diskutera med operatör om relaxation är nödvändigt; i så fall givetvis intubation. Vi har dock även god erfarenhet av SPA för anläggande av PD-kateter.

Carotisoperation

Förstahandsmetod är LA + sedering för att möjliggöra peroperativt neurologstatus. Vid förväntat/planerat shuntbehov vanligen GA (intubation pga peroperativt svåråtkomlig luftväg). GA även vid språksvårigheter, kognitiv dysfunktion eller annat (tex mycket orolig patient) som försvårar/omöjliggör peroperativ neurologisk bedömning. Obligat invasiv blodtrycksmätning och relativ stark indikation för NIRS (near infra red spectroscopy, alltså cerebral oxymetri; tex INVOS) vid GA för neurologisk monitorering (oftast även vid vakna ingrepp).

3.2 Preoperativ utredning vid kärlkirurgi

3.2.1 Riskbedömning

Både öppen och endovaskulär aortakirurgi är associerade med en förhöjd risk för kardiella komplikationer. Patienter med aortapatologier har en ökad prevalens av comorbiditeter.

Operativ risk

Öppen aortakirurgi alltid högrisk; EVAR intermediär. Bedöm i övrigt blödningsrisk och förväntad hemodynamisk belastning.

Funktionsnivå

Habituell funktionsnivå? Klarar trappor? MET¹-nivå?

Sjukhistoria

Comorbiditeter

3.2.2 Utredning inför kärlkirurgi (sammanfattning/lathund):

EKG: Alla

Spirometri: Känd eller misstänkt KOL samt vid subjektiva besvär (prognostiskt starkt för long-term utfall)

¹ MET = Metabolic Equivalent of Task. Ett fysiologiskt mått på möjligt energiuttag hos patienten. 1 MET definieras som 1 kcal/kg/hr och motsvarar stillasittande. MET > 4 innebär att patienten kan cykla i lugn takt, eller gå raskt. Vid MET > 4 är man vanligen "anestesiologiskt frisk". Andra riktmärken är jogging (6 MET), hoppa hopprep (10 MET) och springa (23 MET).

Kardiologkonsult: Patienter med mycket låg funktionsnivå eller där misstanke finns på hjärtsjukdom och den är svarbedömd pga t.ex perifer kärlsjd. I undantagsfall istället direktremiss för arbetsprov/stress-EKO/hjärtscint.

Hjärt-EKO:

- Öppen BAA, samt FEVAR/GrEVAR/EVAR i generell anestesi: Alltid EKO
- Övriga kärlkirurgiska patienter (inklusive Std-EVAR i LA) är EKO generellt ej nödvändigt om:
 - MET > 4
 - ASA klass 1-2 utan funktionell begränsning
 - Ingrepp helt i regionalblockad eller lokalanestesi

EKO bör göras vid signifikanta comoriditeter/riskfaktorer eller vid annan specifik hjärt-anamnes/frågeställning.

EKO bör alltid utföras vid nyupptäckt dekomensation, sänkt funktionsnivå sista året av oklar genes, oklar andfåddhet och nyupptäckta blåsljud. Språkförbistring eller annat handikapp som omöjliggör pålitlig funktionsanamnes är också en relativt stark indikation för pre-operativt EKO. Detta givetvis framför allt vid planerad GA, men även vid fall som planeras LA/sedering, då språkförbistring och betydande co-morbiditet och därmed begränsad compliance, i sig kan medföra en ökad risk för GA (vid tex planerad carotis-TEA i LA/sedering).

Ovanstående givetvis generella riktlinjer – specifika patientfaktorer avgör i det enskilda fallet.

3.3 Dexmedetomidin för sedering vid kärlkirurgiska ingrepp

Bakgrund

Dexmedetomidin är en selektiv α_2 -agonist som ger en central sympatikolys. Dexmedetomidin har framför allt en sederande effekt men även viss analgetisk och även ringa andningsdeprimerande effekt.

Endovaskulära ingrepp genomförs ofta i lokalanestesi med tillägg av sederande läkemedel. Val av sedering sker individuellt, men kräver att patienten ligger stilla, lätt kan väckas samt medverka till apnéer. Sedering med dexmedetomidin (Dexdor[®]) uppfyller dessa krav och är ett lämpligt förstahandsval. Erfarenhetsmässigt är betydligt lägre doser dexmedetomidin nödvändiga vid denna indikation än vad som är standard inom intensivvården. Vid behov kompletteras smärtlindringen med lokalanestesi i operationssåret eller (i andra hand) fentanyl iv.

Spädning

4 ml dexmedetomidin (100 $\mu\text{g}/\text{ml}$) tillsätts till 36 ml 0,9 % NaCl. Detta ger 40 ml dexmedetomidin i koncentrationen 10 $\mu\text{g}/\text{ml}$.

Administrering

Observera ingen laddningsdos även om pumparna kan vara förprogrammerade för laddningsdos! Starta pumpen och laddningsdosen, men stoppa direkt varvid programmet då automatiskt övergår till underhåll. Därefter kopplas dexmedetomidininfusionen till patienten och underhållsdosering startas.

Underhåll

Vanlig dos vid sedering på denna indikation är dexmedetomidin 0.2-0.5 µg/kg/timma. Förslagsvis inleds infusionen i dosen 0.4 µg/kg/timma så snart patienten är uppkopplad. Efter cirka 10 minuter kan infusionshastigheten halveras och sedan titreras för att landa i intervallet 0.2-0.5 µg/kg/timma. Den sederande effekten kommer efter ca 20 min med ovanstående doseringsförslag.

3.4 Spinaldrän och spinal ischemi

Bakgrund¹⁻³

Vid aortakirurgi, både öppet och endovaskulärt, minskar blodförsörjningen till ryggmärgen vilket kan leda till spinal ischemi. Incidensen av spinal ischemi är ca 10% vid operation av thorakoabdominella och thorakala aneurysm, och risken ökar med längden av aorta som behandlas. Övriga riskfaktorer är embolisering, peroperativ hypotoni, blödning och anemi. Spinal ischemi är en fruktad komplikation och symtomen är paraplegi. Om behandling inleds i tid är symtomen i många fall reversibla. Målet med behandlingen är att öka syrgasleveransen till ryggmärgen. Det görs genom att öka cerebrala perfusionstrycket (CPP) och optimera Hb.

Operationen kan också delas upp i flera seanser så kroppen hinner öka kollateralflödet till ryggmärgen mellan operationerna och därmed minska risken för spinal ischemi.

Spinaldrän används både profylaktiskt och terapeutiskt för att förhindra och behandla spinal ischemi. Spinal ischemi debuterar oftast direkt postoperativt eller under de första 2 dygnen postop. Senare debut förekommer men är ovanligt. Standard behandlingstid med spinaldrän är cirka 48 timmar. Patienter med spinalkateter övervakas på CIVA eller postop. MEP/SEP (motor/somatosensory-evoked potential) kan användas på sövda patienter per/postop för att detektera spinal ischemi.

Spinaldrän

Komplikationer (risk < 5%)

- Infektion (abscess, meningit)
- Postpunktionell huvudvärk
- Spinal- och epiduralblödning
- Subduralhematom
- Lillhjärninklämning

Kontraindikationer

- Patientvägran
- Koagulopati – relativ kontraindikation
- Trauma
- Lokal infektion
- Tidigare paraplegi

Profylaktisk behandling med spinaldrän vid TEVAR / GrEVAR

Preop (inkl op-konferens)

- Risken för spinal ischemi och behovet av spinaldrän värderas av kärlkirurg/angio.
- Inläggandet av spinaldrän planeras på op-konferens. Dokumenteras av anestesilog i journal inkl behov av CVK, noradrenalin, rotationsangio.
- Boka nattplats postop i Orbit två dygn (kär), alternativt anmäl CIVA-behov två dygn (anestesi).
- Antikoagulantia (dock ej trombyl) utsättes enl rutin för ryggstick (kär/anestesi).
- Koagulationsstatus preop. Korrigera koagulopati vid behov (kär).

Operationsdag

- Verifiera postop / CIVA plats innan op-start.

- Artärnål höger (vänster ibland steriltvättad).
- PVK x 2-3 med förlängare. Säkerställ bra infarter då tillgång till extremiteter saknas perop.
- CVK – noradrenalininfusion vanligt och tryckhöjning är lika centralt vid behandling av spinal ischemi som undvikande av hypotension. Dessutom ofta suboptimal access perifert med steriltvättad vänster arm.
- Noradrenalininfusion (se ovan)

Kateterinläggning samt dräneringssystem Becker

Inläggning av spinaldrän görs sterilt och minst 60 minuter innan heparin. Följande behövs:

1. Vanligt EDAsset vid uppdukning (+ stort uppdukningbord och gärna assistent).
2. Spinaldränsset: Integra Lumbar Catheter Accessory Kit (alternativt 16 G EDAnål + kateter för dränering. OBS ej filter).
3. Beckersystem: Förbereds och fylls på sterilt med NaCl av op-ssk.
4. Tryckdom (separat eller från artärset). Kopplas till Beckersystemet.

Integra Lumbar Catheter Accessory Kit (1:a hand) 14G Tuohynål. 80 cm röntgentät silikonkateter, längdmarkerad till 30 cm med en innerdiameter på 0,7 mm med plats för ledare. Katetern har flera dräneringsöppningar och slutet spets. Genomspola katetern och ledarens skyddshylsa med NaCl (9 mg/ml) före införandet av ledaren i katetern för att underlätta avlägsnandet av ledaren när katetern är i spinalrummet. Insticksnivå L2-L5. Katetern bör inläggas 10 cm i spinal rummet. Från hudplan minst 15 cm. Det rekommenderas starkt att vara två sterila anläggare då ledaren (även vid ovan förberedelse) kan vara mycket svår att utan assistent få ut från katetern. Kompromissa ej på genomspolning med NaCl innan anläggande och håll katetern sträckt när ledaren tas ut. Var även mycket aktsam på att ej komprimera katetern mot ledaren när du, eller helst assistenten, drar ut densamma.

Portex Epidural set med 16 G Tuohy nål och kateter (2:a hand) Kan användas (standard på neuro). Katetern har 3 sidohål och spetsen är öppen. Inläggningsteknik enligt ovan (ej ledare).

Tryckmätning

Nollnivå placeras i nivå med spinalkanalen lumbalt (motsvarar mid-axillärlinjen i planläge/cirka 5 cm ovan underlaget). Vid lägesändring av operationsbordet korrigerar nollnivån enligt ovan. Dränet ställs in för dränering = öppet på ordinerad nivå (vanligen 5-20 mmHg). Stäng dränet vid ICP-mätning och vid excessiv dränering (> 20 ml/timme). Öppnas åter följande timme. **Vid mobilisering postop, patientförflyttning, och vid varje lägesförändring av operationsbordet stängs dränet tillfälligt.**

Peroperativ handläggning

- Spinaldrän öppet på 10 mmHg, men justera kontinuerligt utifrån dränerad volym.
- MAP > 80 mmHg.
- Dränera 5-20 ml/timme kontinuerligt - minimerar risken att dränet clottar.
- Max perioperativ dränerad volym bör ej överskrida 150 ml. Excessiv dränering av CSF kan öka risken för subduralhematom och i värsta fall inklämning.
- Om blod i katetern sänk dräneringshastigheten till 1-2 ml/timme.

Postop (CIVA/postop)

Undvik och behandla aktivt:

- Hypotension
- Hypoxi
- Hyperkapni
- Hyperglykemi

- Hypertermi
- Shivering

Sövd/sederad pat (då neurologin ej är bedömbär; ffa CIVA)

- Wake up var 4:e tim om möjligt för neurologstatus.
- Spinaldrän initialt öppet på förslagsvis 10 mmHg, men justera utifrån dränerad volym.
- Kontrollera ICP 1 gång/timme (stäng dränet tillfälligt någon minut vid avläsning).
- Dränera 5-20 ml/timme.
- ICP \leq 10 mmHg.
- MAP > 80 mmHg.
- Hb > 100 g/l

Vaken pat (postop/CIVA)

- Följande kontrolleras 1 gång/timme:
- Neurologstatus
 1. Grov motorik - Lyft sträckt ben (endast röra på tårna ej tillräckligt sensitivt).
 2. Sensibilitet – Sensorik för beröring i ben bilateralt. Jämför med armar vid behov.
- ICP (stäng dränet tillfälligt någon minut vid avläsning).
- Droppkontroll (dränerad volym). Max 20 ml/timme. **Dränerad volym bör ej överstiga 150 ml per dygn om patienten ej uppvisar neurologiska symtom.** Om excessiv dränering låt dränet vara stängt 15-30 min/timme.
- Vid mobilisering stängs dränet tillfälligt.

Normal neurologi

Spinaldrän öppet 15-20 mmHg. ICP upp till 20 mmHg accepteras. Dränera 1-20 ml/timme. Ansvarig kärlkirurg beslutar när likvordränningen ska avslutas (oftast 48 timmar postop).

Neurologiska bortfallssymtom = Spinal ischemi

Kontakta narkosjour samt ansvarig kärlkirurgjour. Höj MAP och öka dräneringshastigheten. Vid spinal ischemi accepteras dränerad volym upp till 200 ml/dygn. Sänk ICP stegvis och utvärdera neurologin.

Mål vid spinal ischemi:

- ICP \leq 5 mmHg
- MAP > 100 mmHg
- Hb > 100 g/l
- Saturation > 97%

Blodtillblandad CSF

Höj spinaldränet temporärt (15-20 mmHg) för att skapa ett visst mottryck. Fortsätt dock dränera 1-5 ml/timme för att inte dränet ska clotta. Korrigera ev koagulopati. Mät ACT. Överväg plasma. Om klar CSF återgå till rutin. Om neurologiska symtom överväg radiologi.

Avveckling av likvordränage

Om okomplicerat förlopp oftast cirka 48 timmar postop; läkarordination. Stäng av dränet 4 timmar. Om normal neurologi (motorik + sensorik) avlägsnas dränet. Ej nödvändigt att odla kateterspets rutinmässigt. Vid misstänkt infektion odla även CSF.

Trombosprofylax seponeras enl gällande riktlinjer inför dragning av spinalkatetern. Planläge 4 timmar efter att katetern avlägsnats. Om postspinal huvudvärk max 30° höjd huvudända. Om postpunktionell huvudvärk >48 timmar kan blood-patch övervägas efter samråd med kärlkirurg.

Sen spinal ischemi

Spinal ischemi och paraplegi kan uppstå månader postop och det är ett akuttillstånd!
Behandling inleds omedelbart för att om möjligt undvika permanent paraplegi.

Mål:

- Hög MAP > 100 mmHg – viktigast!
- Hb > 100 g/l.
- Saturation > 97%
- Sätt spinaldrän. Dränera likvor till ICP < 10 mmHg. Om fortsatta symtom försök sänka ICP till 5 mmHg.

Koagulationsrubbing/antikoagulantia: Risken för blödning i samband med ryggstick måste vägas mot risken för permanent paraplegi, dvs individuell bedömning. Koagulopati och uteslutning av spinalt hematoma utreds och behandlas parallellt med ovanstående och i samverkan med kärlkirurg. Oftast lämpligen CT-skalle + rygg (MR går ej pga att stentgraftet ger störningar). Spinalt hematoma relativt sannolikt (ryggstick + heparin) men så även stroke (högrisk för cerebrala embolier).

3.5 Postop checklista för kärlkirurgi

Perifer kärlkirurgi/EVAR

- Fri mobilisering? Planläge? Hur länge?
- Kontroller: puls, doppler (markerat?), hur ofta?
- Fragmin: när, dos, ordinerad i Take Care?
- Antibiotika: om och när, ordinerad i Take Care?
- Blodtrycksgränser
- EDA-aktivering post op, förväntat behov eller ej
- Hur lång post op tid?
- Fasta?
- Sökare/telefon ansvarig kärlkirurg
- Annat

Carotis

- Följ ordinarie riktlinjer postop carotis – avsteg/extra?
- Fragmin: när, dos, ordinerad i Take Care?
- Antibiotika: om och när, ordinerad i Take Care?
- Blodtrycksgränser
- Fasta?
- Sökare/telefon ansvarig kärlkirurg
- Annat

Fistel

- Kan patient åka direkt till avdelning? (aktuellt om endast lätt sedering given)
- Svirr i fistel, hur ofta kontrollera?
- Blodtrycksgränser
- Sökare/telefon ansvarig kärlkirurg
- Annat

4 Aortakirurgi

4.1 Anestesi vid öppen operation av bukaortaaneurysm (BAA) - elektiv / akut

Bakgrund⁴⁻⁷

Rupturerat bukaortaaneurysm (rBAA) är ett mycket allvarligt tillstånd och hälften av patienterna avlider utanför sjukhus. Enligt data från det svenska kvalitetsregistret för kärlkirurgi (Swedvasc 2016) är 30-dagarsmortaliteten efter rupturerat bukaortaaneurysm vid öppen operation cirka 26% och något lägre vid endovaskulär behandling (17-22%). Vid elektiv öppen operation av infrarenala BAA är mortaliteten knappt 2.5%, medan EVAR (endovascular aorta repair) medför kortare vårdtid och lägre 30-dagars mortalitet (< 2%). Vid långtidsuppföljning suddas dock denna skillnad ut. EVAR är idag förstahandsbehandling vid såväl elektiv som akut operation, men kräver rätta anatomiska förutsättningar och god kartläggning med CT-angio innan operation.

BAA definieras som en vidgning av aortadiametern > 1,5 ggr det normala. Aortaaneurysm är vanligast i buken, nedanför njurartärerna, och hos män över 60 år. Riskfaktorer är långvarig hypertension, rökning, hjärt-kärlsjukdom, ärftlighet samt bukfetma. Samtliga landsting i Sverige erbjuder screening av aorta för män vid 65 års ålder. Aortaaneurysm är oftast asymptomatiska vid upptäckt, men en del patienter söker för diffusa buksmärter, ryggsmärter eller en pulserande resistens. Vid oklusiv sjukdom domineras symptomen av perifer ischemi/claudicatio. Aneurysmen expanderar hela tiden och obehandlade aneurysm leder förr eller senare alltid till ruptur. Ruptur ger intensiva smärter, ofta syncope, och leder obehandlat till död. Aneurysmens storlek är den enskilt viktigaste riskfaktorn för ruptur. Aneurysm > 7 cm i diameter har en rupturrisk på ca 30% per år. Indikation för elektiv operation av BAA är aortadiameter > 5,5 cm hos män och ca 5,0 cm hos kvinnor.

Elektiv BAA-operation

Kirurgi

Vanligtvis används en transperitoneal approach via ett långt medellinjessnitt, men även en retroperitoneal approach via flanksnitt i sidoläge förekommer (framför allt vid juxtarenala och suprarenala aneurysm). Målet är att säkerställa proximal och distal kontroll av aorta och iliacakärlen. I samband med proximal och distal dissektion uppstår ibland venösa blödningar. När dissektionen är klar, men innan aortaklampning, ges heparin iv på ordination av kärlkirurg (normalt 3000-5000E Heparin). Därefter klampas aorta proximalt om aneurysmet med aortatång och distalt om aneurysmet på aorta (rakt graft) eller på iliacakärlen (bifurkerat graft). Aneurysmet öppnas longitudinellt och backblödning från lumbalartärer och a.mes.inf. (IMA) ligeras. Ett graft sys först in proximalt och anastomosen testas och tätas vid behov. Aortatången flyttas till graftet och distala anastomosen/erna sys. Vid iliacaaneurysm eller dålig distal aorta används ett bifurkerat graft, annars ett rakt graft. Innan sista distala suturen dras åt blöder man igenom graftet och backblöder från iliaca för att avlägsna eventuella koagel och luft. Aortatången avlägsnas och eventuellt anastomosläckage sutureras (ibland med proximal clamp). Aneurysmsäcken sluts och till sist även fascia och bukvägg.

Anestesiologiska aspekter

Både elektiv och akut öppen BAA-operation medför stora hemodynamiska påfrestningar på patienten, och ställer stora krav på anestesologen för att minimera ogynnsam organbelastning. Patienterna har ofta multipel comorbiditet och hög ålder som kräver preoperativ evaluering/optimering och perioperativ anpassning. Induktion, aortatång, tångsläpp samt blödning är de största utmaningarna, men även att bevara normotermi, minimera koagulopati och postop smärta är centralt.

Induktion (ofta opiatbaserad) genomförs med målsättning att bevara stabil hemodynamik för att minimera belastning på aneurysm och eventuell kranskärlsjukdom/hjärtsvikt. Effekten av **aortaklampning** varierar stort, men ju mer proximalt aorta stängs av, desto större hemodynamisk påverkan. Klampning av aorta gör att hjärtat plötsligt måste pumpa mot ett mycket större motstånd, vilket medför risk för akut hjärtsvikt. Infrarenal aortatång hos den hjärtfriska orsakar sällan stora bekymmer, medan hos den hjärtsjuka och särskilt i närvaro av kranskärlsischemi, kan denna afterloadökning leda till dekompenisering. Aortaklampning leder till både en afterload- och en preloadbelastning på hjärtat och denna belastning måste minimeras. Oftast räcker det med justering av noradrenalin dosen och ökat narkosdjup (sevofluran sänker SVR), men ibland behövs nitropreparat. Hjärtfunktion monitoreras med TEE och invasiv blodtryckskurva. Hos patienter med ocklusiv aortasjukdom blir hemodynamiska belastningarna oftast mindre pga utvecklade kollateraler.

Tångsläpp leder till en momentan minskning av SVR, central hypovolemi, samt reperfusion av vasodilaterande och kardiodepressiva metaboliter. Effektens magnitud beror på duration (ischemitid) samt nivå av aortaklampning. Tångsläpp kräver obligat närvaro av erfaren anestesilog, men även förvarning från operatör krävs ca 5-10 min innan tångsläpp för att optimera patienten, framför allt volymsmässigt. Monitorering med TEE och kontinuerlig CVP-mätning utöver artärkurva rekommenderas. Volym, noradrenalin höjning, buffring samt lätt hyperventilation krävs ofta strax innan och i samband med tångsläpp. Beredskap bör finnas för bolus efedrin. Reklampning eller manuell partiell kompression av aorta är ibland nödvändigt för att tillfälligt minska/reversera de hemodynamiska effekterna. Rakt aortagraft medför i regel större blodtrycksfall än aortobifemoralt graft där påsläpp sker i två omgångar.

Incidensen av postop **njursvikt** ledande till dialys är ca 0,5%. Preoperativ njursvikt och suprarenal tång (med längre tångtid än 30 minuter) är den största riskfaktorn. Dock kan även infrarenal tång minska njurgenomblödningen med upp till 40%, och all form av aortakirurgi är förenat med risk för njursvikt (incidens 5-18%). Mannitol, furix, lägdos dopamin, acetylcystein samt natriumbikarbonat är teoretiskt njurskyddande och används ibland som njurprotektion även om evidensen är låg. Viktigast är att bevara MAP och normovolemi.

Spinal ischemi och paraplegi är en fruktad komplikation till aortakirurgi. Orsaken beror på att aortagraften blockerar en del av blodflödet till ryggmärgen. Incidensen av paraplegi är idag 0,5–10% vid thorakala aneurysm, 5-10% vid thorakoabdominala aneurysm (TAAA), samt 3-8% vid TEVAR. Incidensen ökar vid täckning av mer än 20 cm av thorakala aorta (framför allt Th8-L1). Anamnes av tidigare operation av infrarenal aorta, ocklusion/täckning av a. subclavia sin. eller a. iliaca int., samt peri- och postoperativa blodtrycksfall ökar risken för spinal ischemi. Vid operation av enbart infrarenala bukaorta är risken för spinalischemi mindre än 1%.

Spinal ischemi manifesteras vid öppen kirurgi oftast direkt perioperativt, men vid endovaskulär behandling sker en långsammare trombotisering av kollateralblodflödet till ryggmärgen. Ökat spinalt tryck och ischemi kan inträffa 24-48 timmar efter ingreppet.

Det saknas prospektiva randomiserade studier gällande användning av spinalkateter vid TEVAR, men resultatet från en metaanalys¹ indikerar att man minskar risken för spinal ischemi med upp till 50% genom likvordrånage. Anläggande av spinalkateter utförs efter

diskussion med ansvarig operatör, anestesilog och IVA-läkare. Se separat riktlinje "Spinaldrän och spinal ischemi".

Upplägg vid öppen elektiv BAA-operation

Lång värmemadrass (initialt på 43 grader; under tängsättning max 38 grader för att undvika hypertermi i nedre kroppshalvan)

Grova PVK samt artärnål innan sövning

Thorakal EDA (sedvanliga kontraindikationer)

Induktion och intubation med mål att bevara stabilt blodtryck – gärna opiatbaserat

3-lumen CVK (vasoaktiva läkemedel, inotropi, CVP)

TEE-monitorering för volymsoptimering och kartläggning av hjärtfunktion

Cellsaver

Högflödesinfusionssystem uppkopplat och minst två E-konc samt två plasma beställda.

Akut öppen operation / Rupturerat bukaortaaneurysm (rBAA)

rBAA debuterar ofta urakut med buksmärter och ibland även syncope. Diagnos ställs med anamnes, status, ultraljud buk och/eller CT. Ruptur ut i fri bukhåla leder i regel till omedelbar död, medan en ruptur bakåt tillfälligt kan tamponeras av ett begränsat retroperitonealt utrymme. Det finns dock en stor risk att patienterna börjar blöda på nytt vid blodtryckstegring, i samband med resuscitering eller anestesistart och därvid associerad blodtryckstegring, och/eller minskad muskeltonus, samt vid öppning av buken. Målet är att minimera tiden från diagnos till aortatång. Basal utredning (EKG, anamnes, rutinprovtagning, och eventuell CT buk) görs efter avvägande. Blod beställs på rutin (8 E-konc + 8 plasma). Patienten hanteras skyndsamt men också varsamt för att minimera risk för reblödning; man avstår därför oftast från EDA. Sätt artärnål samt tvätta och klä patienten. Sövning först när operatör står sterilklädd.

Permissiv hypotension (SAP 50-100 mmHg) fram till aortatång är etablerad praxis för att minimera reblödningsrisk. Samtidig god smärtlindring är essentiellt. För att minimera väggstressen på aorta vid dissektioner är målet att även minska hjärtfrekvensen med mål lägre än 60 slag per minut och samtidigt SAP under 120 mmHg. Vid instabil patient i shock överväg hybridgrepp med endovaskulär ocklusionsballong i aorta innan sövning (REBOA; Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta). Idag opereras i Sverige cirka 40% av akuta aortarupturer endovaskulärt.

Upplägg vid öppen akut BAA-operation

Lång värmemadrass (initialt på 43 grader; efter tvätt och drapering 38 grader för att undvika hypertermi i nedre kroppshalva efter tängsättning.)

Ryggläge, tvätta och klä före anestesistart (ej KAD – suprapubisk kateter vid behov)

Artärnål (bedöva innan) och grova PVK, helst CVK/secalon, innan sövning

Förbered för massiv transfusion; uppkopplat högflödesinfusionssystem, blod kontrollerat och på sal.

Cellsaver (om kompetens och resurs finns för att koppla upp).

Förbered ketalar, celocurin, fentanyl, noradrenalin och eventuellt adrenalin (utspädd till 10 µg/ml)

Operatör operationsklar innan induktion

Huvudalternativ: RSI med ketalar + celocurin följt av ketalarinfusion

Successiv övergång till sevoflurane om cirkulationen tillåter, oftast inte innan blödningskontroll

TEE är ett utmärkt sätt att monitorera hjärta- och volymstatus.

Betänk och förhindra övertransfusion i din iver att restituera cirkulationen!

Postoperativt

Oftast delayed extubation på CIVA så snart man etablerat stabil cirkulation och ventilation, normotemperatur och fungerande smärtlindring.

Följ rutinprover inklusive koagulationsstatus, hjärtmarkörer och myoglobin. Buktryck, bukstatus, njurfunktion och perifer cirkulation (ffa ben) monitoreras. Betablockad, statiner och ASA återinsätts så fort som möjligt.

4.2 Anestesi vid elektiv EVAR på hybridsalen

Bakgrund

EVAR (endovascular aortic repair) har på senare år blivit standardmetoden för behandling av abdominella aortaaneurysm, akuta såväl som elektiva. Operationsmetoden har visat sig vara skonsammare och kan göras på äldre och sjukare patienter som annars inte skulle vara aktuella för stor öppen kirurgi. Ingreppet utförs via katetrar från ljumskarna bilateralt. I enstaka fall behövs kompletterande access uppifrån, då oftast från vänster arm. Ingreppet kräver vissa anatomiska förutsättningar i relationen mellan aneurysm och det "friska" kärlträdet och det kräver att patienten ligger stilla, inklusive upprepade apnéer under de moment där man tar bildserier för kartläggning av kärlträdet och exakt positionering av stentgraften. Detta bör beaktas vid val av anestesiteknik.

Till skillnad från öppen aortakirurgi belastas patienten med röntgenstrålning och njurtoxisk kontrastvätska, men i övrigt dominerar fördelarna. Aortaocklusion med ballong sker endast kortvarigt och ger sällan någon märkbar hemodynamisk påverkan vid buk-EVAR ingrepp. Ingreppet ger i normalfallet endast små blodförluster genom kärlportarna (<500 ml peroperativ blödning).

Preoperativ bedömning

En grundlig preoperativ medicinsk utredning är oftast genomförd i kärlkirurgens regi. Utlåtande från spirometri, hjärt-EKO och EKG finns då vid anestesi-bedömningen. Hjärt-EKO troligen ej nödvändigt hos en i övrigt frisk patient utan hjärtanamnes som ska genomgå en standard-EVAR i LA och behovet av kompletterande undersökningar är i allmänhet låg. β-blockad, ASA och statiner behålls genom hela vårdförloppet. Vid behov anpassas antitrombotisk behandling om ryggbedövning planeras, men trombyl skall normalt kvarstå. ACE-hämmare och angiotensin II-blockerare behöver inte sättas ut rutinmässigt; tydliga riktlinjer saknas dock.

Standard-EVAR / Komplicerad EVAR - Anestesimetod

I samråd med kärllkirurgiska kliniken kan patienterna delas in i en *standard-grupp* och en mer *komplicerad grupp* (tex GrEVAR och TEVAR, se separat riktlinje). Önskemål om anestesimetod ur kirurgiskt perspektiv ska journalföras av kärllkirurgen innan patienten kommer till anestesimottagningen; alternativt skriver narkosläkaren en kort anteckning i samband med operationskonferens. Anestesimetod för standard-EVAR är i första hand lokalanestesi med dexmedetomidinsedering, i andra hand regional anestesi, och i tredje hand generell anestesi. Vid mer komplicerade EVAR anpassas anestesival efter operatörens behov, patientens sjuklighet och möjlighet att ligga still. Tillägg av sedering kan övervägas vid lokal och regional anestesi. Val av sedering sker individuellt, men kräver att patienten ligger stilla, samt samtidigt lätt kan väckas och medverka till apnéer. Förstahandsval för sedering är dexmedetomidin (0.2-0.5 µg/kg/h); andra välfungerande preparat är remifentanyl (0.01-0.04 µg/kg/min), fentanyl, midazolam samt propofol i lågdos.

Upplägg

Tejplinjal med röntgentäta markeringar appliceras thorakolumbalt till höger om ryggraden efter anmodan kärllkirurg. Bägge armar ska ofta vara utmed kroppen och bäddas in som vid robotkirurgi. Planera infarter (inklusive förlängare) efter dessa förutsättningar; dvs möjligheten till ytterligare nålsättning efter operationsstart kan vara begränsad. En flexibel narkosbåge samt droppställning fästs vid en kälke som träs på operationsbordet från huvudändan. Robotarmen (att likställas med C-båge) kommer under operationen in från patientens vänstra sida och där ryms endast en droppställning som måste vara placerad väl ovanför narkosbågen och bakom huvudändan. All övrig apparatur placeras på patientens högra sida och ej under operationsbordet. Robotarmen känner hela tiden av var operationsbordet är, men däremot känner den inte av armbord och droppställningar. Om robotarmen krockar med tex armbord kan den lätt skadas och varje gång den krockar stannar den upp och måste "läsas upp" manuellt.

Monitorering

Artärkateter (helst via höger a. radialis), 2 st PVK (1.4-2.0 mm), timdiures med temp-KAD, samt 5-avlednings-EKG är rutin. Koppla enmetersförlängare till samtliga PVKer för smidig läkemedelsadministrering och samtidig minimering av anestesipersonalens stråldos. CVK sätts endast på indikation, tex vasoaktiva läkemedel. TEE används rutinmässigt vid öppen aortakirurgi och kan vid behov även användas vid EVAR i GA. Övertryckssystem för vätskor och blodprodukter behöver inte vara uppkopplade, men ska finnas tillgängliga i händelse av blödningskomplikation och konvertering till öppen kirurgi.

Övrigt

Antibiotika skall vara ordinerat av operatör och ges 30-60 min innan operationsstart. Ekva-cillin 2 g iv är standard, denna dos upprepas var fjärde timme perop. Dalacin 600 mg vid PC-allergi.

Säkerställ tidigt normovolemi för att minimera den njurtoxiska effekten av kontrastmedel. Hydrering sker i första hand med RingerAcetat. Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion används ibland CO₂ som kontrast (så kallad negativ kontrast). Injektioner av CO₂ kan ge övergående vadkramper (ischemismärtor) och på dessa patienter kan en spinalbedövning ge optimal smärtlindring (om koagulationsstatus tillåter detta).

Heparin iv ges som bolusdos på operatörens ordination (ca 50-100E/kg), ofta 5000E. Heparineffekten monitoreras med ACT (activated clotting time) på ordination av operatör. Terapeutisk mål för ACT är (200)-250-300 sekunder. ACT-apparaten förvaras bredvid hybridsalens blodgasapparat och kuvetter finns i kylskåpet på hybridsalen. Heparin kan reverseras med protaminsulfat. Doseringen är uttalat individuell; 1 ml (10 mg) reverserar

1400 E heparin och utifrån detta ger man förslagsvis 1-3 ml och utvärderar effekten efter 15 minuter med ACT. Protamin är allergent varför huvuddosen bör föregås av en testdos.

Glöm inte att operatören kan komplettera med infiltration av LA i såren om eventuell ryggbedövning håller på gå ur; hela ingreppet kan ju ske i LA.

Postoperativt

Vanligen 4-6 timmars övervakning på postop med särskild observans av blödning/hematom i ljumskar samt perifer cirkulation. I samband med Sign Out kommer man lämpligen överens med operatör om lämpliga kontroller vad gäller distalstatus ben som funktion av aorta/stentgenomblödning.

Upprätthåll god diures och normovolemi. Klexane/Fragmin sc enligt ordination (ofta 3-6 timmar postop). Fortsatt kardioprotektiv strategi vilket kan innefatta β -blockad, O₂, värme samt ordinarie kvällsdos av statin.

Strålskydd

Det finns huvudsakligen tre faktorer som påverkar stråldosen - tid, avstånd och skärmning.

Tid - genom att reducera tiden man befinner sig i strålfältet så minskas stråldosen i motsvarande grad. Dvs minimera tiden som du arbetar med patienten under pågående strålning.

Avstånd - genom att öka avståndet från strålkällan avtar strålningen proportionellt mot kvadraten på avståndet. Om man dubblar sitt avstånd till patienten minskar således strålningen till en fjärdedel. När operatören genomför sina röntgenkontrastserier och samtidigt ber om apnéer, ges de största stråldoserna. Säkerställ då att du befinner dig bakom skärmen och backar.

Skärmning - genom att använda ett röntgentätt material mellan dig och strålkällan minskar strålningen och därmed stråldosen. Använd blyförkläde, halsskydd samt glasögon. Komplettera med blyglasskärm.

4.3 Anestesi vid komplicerad endovaskulär aortakirurgi

Thorakal EVAR (TEVAR)

Fenestrerad EVAR (FEVAR)

Grenad EVAR (GrEVAR)

Spinaldrän / Lumbaldrän

Bakgrund

Var god se riktlinje EVAR för bakgrund och upplägg vid standardfall.

EVAR (endovascular aortic repair) har på senare år blivit standardmetoden för behandling av abdominella aortaaneurysm, akuta såväl som elektiva. Med nya specialdesignade graft, avancerade CT-protokoll samt utveckling av endovaskulär teknik kan man operera komplicerade aneurysm såväl thorakalt som abdominellt.

Att beakta vid anestesiplanering vid dessa ingrepp

Förutsätter en grundlig preoperativ medicinsk utredning (tex comorbiditeter, funktionsnivå, läkemedel och oftast EKO samt spirometri).

Genomgång på op-konferens av aktuell patologi, planerad procedur, accesser, risker och upplägg.

Vanligen lång op-tid och därför GA första hand (gäller dock inte alltid okomplicerad TEVAR).

Ofta planerad postop övernattning och obligat två nätter vid spinaldrän (kräver Orbitanmäl-an nattpatient och förvarning/diskussion med postop).

Ofta accesser från ljumske + arm/hals/subclavia – ökad blödningsrisk? Speciellt upplägg (tex vid rotationsangio)?

Förbered för möjlighet att tryckhöja med noradrenalininfusion (ibland i kombination med spinaldrän för att motverka spinal ischemi).

Observera att det inte finns någon synlig tillgång till patientens extremiteter efter att patienten är tvättad och sterilklädd (att beakta vid administrering av vasoaktiva läkemedel samt transfusion med högflödesinfusionssystem).

Ökad embolirisk inklusive cerebral embolisering pga ledare högt i aorta.

Risk för takyarytmi vid ledare ner i vänster kammare – be operatör backa ledare.

Anestesiplanering

Säkerställ nattplats på postop (oftast planerad vårdtid 2 dagar), alternativt CIVA-plats som verifieras innan sövning.

Artärnål höger arm eller ibland dubbla artärnålar (vid risk/planering för ballongocklution eller täckning av a. subclavia sin.).

Spinaldrän på ordination och efter diskussion med operatör. Se separat riktlinje "Spinaldrän och spinal ischemi".

Ofta GA. LA/sedering, SPA och EDA möjligt om adekvat patientmedverkan (tids- och apnémissigt).

CVK – obligat vid spinaldrän (pga tryckhöjning med noradrenalin; CPP = MAP-ICP för behandling av spinal ischemi) eller då man bedömer PVK ej tillräckligt (mkt låg tröskel).

TEE (vid GA).

Planera för noradrenalininfusion.

Säkerställ adekvata infarter då tillgång till extremiteter saknas.

OBS – vid behov kan man alltid be kirurg om ny access (ljumskarna).

Njurprotektion (kontrastbelasning): Säkerställ välhydrerad patient. Profylax med acetylcystein eller natriumbikarbonat saknar evidens.

Ofta lång operation med risk för sivande blödning (> 1000 ml) från grova introducers. Mål är Hb > 100 g/l för att optimera spinal oxygenering.

Postop CIVA

Beakta (och undersök samt dokumentera) särskilt neurologi (central och perifer), perifer cirkulation, njurstatus samt myoglobin.

Vid spinaldrän: säkerställ noggranna instruktioner/ordinationer från kärlkirurg inklusive telefonnummer till ansvarig kärlkirurg. Se riktlinje "Spinaldrän och spinal ischemi".

Spinaldrän

Se separat riktlinje "Spinaldrän och spinal ischemi".

Vid spinal ischemi

MAP över 100 mmHg - viktigast

ICP högst 10 mmHg

Hb 100 g/l

Samverka med kärlkirurg

CT-skalle + rygg (MR går ej pga att stentgraftet ger störningar)

Uteslut spinalt hematoma (ryggstick + heparin) samt stroke (högrisk för cerebrala embolier)

5 Carotiskirurgi

Trombendartärektomi (TEA) carotis görs i första hand i lokalbedövning med sedering för att möjliggöra kontinuerlig neurologisk utvärdering.

Generell anestesi väljs vanligen när man vet att patienten behöver en shunt peroperativt eller vid kommunikationssvårigheter som försvårar neurologisk bedömning och möjlighet till utvärdering och samarbete under operation. Även mycket oroliga patienter kan behöva GA.

Förberedelser och förfarande med infarter och vasoaktiva läkemedel skiljer sig inte mellan LA och GA. NIRS (INVOS) kan anses mer indicerat vid GA, men används vanligen även vid vakna patienter; evidensen är något konflikterande.

Noteras bör att akut carotiskirurgi ofta ej är timkritisk, men kan likväl kräva åtgärd under jourtid, då symptomgivande carotisstenos (TIA, amaurosis fugax) medför betydande risk för stroke till följd av instabila plaque.

5.1 TEA Carotis i LA+sedering

Patientförberedelser

3 st PVK i tillgänglig arm (en minst grön/1,3 mm samt två minst rosa/1,1 mm)

Artärkateter

KAD

Preoperativt neurologstatus. Informera även patient om upprepade kommande kontroller.

Apparatur

Sedvanlig beredskap för generell anestesi om så skulle behövas

Vid stumpmätning (sällsynt): artärtrycket + kort 3-vägs kran med "hane-hane-koppling" och lång tryckslang med im-nål från op-sidan (steril)

3 infusionspumpar (noradrenalin, nitroglycerin, samt dexmedetomidin)

Tidtagning via övervakningsskärm

NIRS (INVOS) inklusive givare

Speciella läkemedel

Färdigställt i sprutpump och kopplat till pat:

Dexmedetomidin (alternativt Propofol) för sedering

Nitroglycerin 1 mg/ml (dosintervall: 0.2-10 µg/kg/min)

Noradrenalin 40 µg/ml

Omedelbart tillgängligt:

Efedrin 5 mg/ml

Fenylefrin 100 µg/ml

Seloken 1 mg/ml

Heparin 5000 E/ml

(dopamin 4 mg/ml)

(Protamin 10 mg/ml; reverserar 1400E heparin)

(Noradrenalin 4 µg/ml; alternativ till efedrin/fenylefrin)

Vätskor

Sedvanlig peroperativ regim

Övrigt

Giltigt BAS-test, blod behöver ej beställas rutinmässigt. Antibiotikaprofylax i form av Ekvacillin 2 g x 1 (eller alternativ efter ordination kärlikirurg).

Förfarande

Mycket viktigt att hitta adekvat sederingsdjup som möjliggör kontinuerlig neurologisk undersökning enligt separat protokoll.

Dexmedetomidin 0.2-0.5 µg/kg/h utan bolus, alternativt propofolinfusion 1 mg/kg/tim efter fentanylbolus 1 µg/kg. Fentanyl kan itereras dosreducerat vid behov. Narkosläkare bör aktivt medverka till en god och stabil sedering även under den tid som carotis ej är avstängd. Under avstängd carotis är läkarnärvaro obligatorisk/mycket starkt önskvärd för neurologisk utvärdering och därav nödvändiga snabba justeringar av anestesin. Innan carotis öppnas brukar man undersöka tillräcklig kollateralcirkulation med hjälp av neurologstatus och/eller NIRS (INVOS) under en provavstängning om 5 minuter.

Artärtrycket balanseras med infusion nitroglycerin 1 mg/ml samt infusion noradrenalin 40 µg/ml till +/- 15-20% från utgångstrycket, dock systoliskt ej under 100 mmHg. Samråd med kärlikirurg.

Under avstängningstiden förs särskilt protokoll över patientens neurologstatus (språk/mik, grov kraft i kontralateral hand samt båda fötter).

NIRS (INVOS) används i samförstånd med operatör – åsikterna går isär vad gäller den kliniska nyttan vid vaken patient. Vid GA är indikationen högre. Normalvärde rSO₂ 50-80%. Sänkning <20% från baslinje bör föranleda åtgärd (blodtryckshöjning, shunt, lägesförändring huvud); <25% från baslinje får anses kritiskt. Sidoskillnad > 10% indikerar asymmetrisk blodförsörjning.

Postop

Vanligen 6 timmar och med blodtrycksgränser SAP 100 till 160 (ofta SAP önskat < 140 första två timmanra). Bör dock bekräftas med operatör vid Sign Out. Postoperativ neurologisk utvärdering enligt schema. Kontakt med operatör och/eller anesthesiolog vid misstänkt blödning eller neurologiska symptom. Fragmin enligt ordination (om avsaknad bör detta verifieras med operatör).

TEA-Carotis
Övervakningsprotokoll POSTOP

Postopsjuksköterska utför neurologstatus var 15:e minut under de första 2 timmarna.

Därefter sker kontroll var 30:e minut under 2 timmar, därefter var 60:e minut samt vid utskrivning.

Standard postop-tid är 6 timmar. Längre tid enl läkarordination.

Kontroll lokalstatus hals. Fragmin enligt ordination TakeCare (saknas ordination kontakts aneläkare).

Vid förändrad neurologi eller svullnad hals kontaktas operatör samt narkosläkare omedelbart.

Datum:

Patient-ID:

Ankomst postop (tid = 0):

Vid misstänkt stroke bör kontakt med interventionssjour på neuroangio tidigt övervägas: 73750 (24/7)

Tid	Medvetandegrad	Motorik arm (vä/hö)	Motorik ben (vä/hö)	Ansiktsmotorik	Tal	Lokalstatus	Kommentar
	1 Fullt vaken 2 Slö/oklar 3 Somnolent 4 Ej kontaktbar	1 Normal kraft 2 Något svag 3 Mycket svag	1 Normal kraft 2 Något svag 3 Mycket svag	1 Utan anmärkning 2 Avvikande	1 Utan anmärkning 2 Dysfasi 3 Afasi	1 Utan anmärkning 2 Svullnad	
Ankomst (tid = 0)							
0:15							
0:30							
0:45							
1:00							
1:15							
1:30							
1:45							
2:00							
2:30							
3:00							
3:30							
4:00							
5:00							
6:00							
Utskrivning							

6 Referenser

- 1 Khan, N. R., Smalley, Z., Nesvick, C. L., Lee, S. L. & Michael, L. M., 2nd. The use of lumbar drains in preventing spinal cord injury following thoracoabdominal aortic aneurysm repair: an updated systematic review and meta-analysis. *Journal of neurosurgery. Spine*, 1-11, doi:10.3171/2016.1.spine151199 (2016).
- 2 Banga, P. V. *et al.* Neuromonitoring, Cerebrospinal Fluid Drainage, and Selective Use of Iliofemoral Conduits to Minimize Risk of Spinal Cord Injury During Complex Endovascular Aortic Repair. *Journal of endovascular therapy : an official journal of the International Society of Endovascular Specialists* **23**, 139-149, doi:10.1177/1526602815620898 (2016).
- 3 Rossi, S. H. *et al.* Neuroprotective Strategies Can Prevent Permanent Paraplegia in the Majority of Patients Who Develop Spinal Cord Ischaemia After Endovascular Repair of Thoracoabdominal Aortic Aneurysms. *European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery* **50**, 599-607, doi:10.1016/j.ejvs.2015.07.031 (2015).
- 4 Wozniak, M. F., LaMuraglia, G. M. & Musch, G. Anesthesia for open abdominal aortic surgery. *International anesthesiology clinics* **43**, 61-78 (2005).
- 5 Ellard, L. & Djaiani, G. Anaesthesia for vascular emergencies. *Anaesthesia* **68 Suppl 1**, 72-83, doi:10.1111/anae.12048 (2013).
- 6 Qadura, M. *et al.* Mortality and reintervention following elective abdominal aortic aneurysm repair. *Journal of vascular surgery* **57**, 1676-1683, 1683.e1671, doi:10.1016/j.jvs.2013.02.013 (2013).
- 7 Edwards, S. T. *et al.* Comparative effectiveness of endovascular versus open repair of ruptured abdominal aortic aneurysm in the Medicare population. *Journal of vascular surgery* **59**, 575-582, doi:10.1016/j.jvs.2013.08.093 (2014).

7 Index

A

ACT.....	15
Activated Clotting Time.....	See ACT
aortaklampning.....	12
apné.....	5
AV-fistel.....	6

B

BAA.....	11
Becker.....	8

C

Carotisoperation.....	6
Cellsaver.....	13
CPP.....	7

D

Dexmedetomidin.....	6
dräneringssystem.....	8

E

embolisering.....	5
EVAR.....	5, 14
Fenestrerad.....	16
Grenad.....	16
Thorakal.....	16

F

feedback.....	3
femoral bypass.....	5
fentanyl.....	15
FEVAR.....	16
Författare.....	3

G

GrEVAR.....	7, 16
-------------	-------

H

Heparin.....	8, 11, 15
--------------	-----------

I

Integra Lumbar Catheter Accessory Kit.....	8
Introduktion.....	3

K

kärlkirurgi.....	5
------------------	---

L

Laparotomi.....	5
likvordrånage	9
Lumbaldrän	16

M

MEP	7
midazolam.....	15

N

Njurprotektion.....	17
---------------------	----

P

paraplegi.....	7, 12
Perkutana ingrepp	5
propofol.....	15
PTA.....	5

R

remifentanil	15
Rupturerat bukaortaaneurysm	11

S

sedering.....	6
SEP	7
spinal ischemi	7
Spinal ischemi.....	12
Spinaldrän.....	7, 16
Spinalt hematom.....	10
Standard-EVAR	15
ST-läkare	4
stroke.....	10
Strålskydd	16
SVR.....	12

T

TEE.....	5, 14, 17
TEVAR.....	7, 16
Tryckmätning.....	8
Tångsläpp.....	12

U

Upplägg.....	15
--------------	----

A

α 2-agonist	6
--------------------------	---