

2020-03-27

## Checklista vid sövning på traumarum vid misstanke/bekräftad Covid-19 smitta

### Förberedelser:

- Sedvanliga indikationer för sövning gäller.
- Personal utan FFP2/FFP3 munskydd har ett avstånd >2 m från patienten i samband med luftvägshantering. Dubbla handskar.
- Videolaryngoskop med adekvat blad.
- Tub, tubtejp, kuffspruta.
- Sug
- Stetoskop
- Anestesi-läkemedel, muskelrelaxantia, vasopressor
- Sopkorg vid huvudända
- En anestesipersonal håller sig ren och handräcker utrustning från kommod.

### Sövning/intubation:

- Plastfilm över ansikte på medvetslös patient eller när patienten somnat.
- Traumaledare stabiliserar halsrygg under intubationsmomentet.
- Preoxygenera med tät mask via anesthesiapparat.
- Normalfall RSI och undvika maskventilation.
- Gasflödespaus/standby-läge och klampad tub vid isärkoppling.
- Videolaryngoskop skall användas.
- Valfyllt kuff.
- Om möjligt v-sond i samma seans.

### Briefing:

- Genomgång av rollfördelning, läkemedelsdoser och plan för luftväg inkl plan B och C.

Checklista framtagen 27 mars 2020 av Malin Jonsson Fagerlund, Magnus Hedberg, Niclas Hellström

### Versionshistorik

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
1	2020-03-27		